

Rivo Sıvı Solucan Gbresi İerik Tablosu	
Garanti Edilen İerik	w/w
Toplam Organik Madde	%8
Toplam Azot (N)	%0,6
Organik Azot (N)	%0,3
Toplam Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	%0,01
Suda znr Potasyum Oksit (K ₂ O)	%0,8
Toplam Humik+Fulvik Asit	%3
EC	2,5 dS/m
pH	3-5

Rivo Sıvı Solucan Gbresi Kullanım nerileri		
Kullanım Alanı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu
Tahıl Yetiřtiricilięi	Kardeřlenme ve sapa kalkma dneminde uygulanır.	2 L/100 L su
Mısır, Ayieęi, Ttn Yetiřtiricilięi	3-5 yaprak dneminde uygulanır.	2 L/100 L su
řeker Pancarı Yetiřtiricilięi	4-6 yaprak dneminde uygulanır.	2 L/100 L su
Pamuk Yetiřtiricilięi	Taraklanma ncesi uygulanır.	2 L/100 L su
Patates Yetiřtiricilięi	ieklenmeden 15 gn nce uygulanır.	2 L/100 L su
Aık Alan ve rt Altı Sebze Yetiřtiricilięi	Vejetatif geliřme dneminde ve ieklenmeden 20 gn nce uygulanır.	2 L/100 L su
Meyve Yetiřtiricilięi	Hasat sonrası veya ieklenme ncesi ve meyve tutumu sonrası uygulanır.	1-2 L/100 L su
ay Yetiřtiricilięi	İlik srgn ncesi ve her hasat sonrası uygulanır.	2 L/100 L su
Kesme iek Yetiřtiricilięi	Tomurcuk oluřumundan 20 gn nce uygulanır.	3 L/100 L su
im	Vejetasyon periyodu boyunca 20 gnde bir uygulanır.	2 L/100 L su
Saksılı Bitkiler	Tomurcuk oluřumundan 20 gn nce uygulanır. Vejetasyon periyodu boyunca 20 gnde bir uygulama tekrarlanır.	20 mL/1 L su